


Poučenie pri ukončení sledovania v ambulancii

Potvrdzujem, že som bol/a poučená/ý o potrebe používania retenčných fólií na kontrolu a udržanie výsledku ortodontickej liečby. Fólie si každý týždeň vyskúšam, a pokiaľ pocítim tlak, ponechám si v ústach nasadené celú noc. Frekvencia nosenia závisí od náchylnosti zubov k posunom. Uvedomujem si, že nosenie retenčných fólií je jediný spôsob, ako si výsledok ortodontickej liečby kontrolovať a dlhodobo udržiavať, pretože prirodzené zmeny ľudského organizmu v priebehu života sa týkajú aj zubov a čeľustí. V prípade dlhodobého ponechania fixných retainero (drôtikov) na zuboch je pravidelná kontrola fóliami ešte dôležitejšia, pretože fixný retainer môže mať aj po dlhom čase nečakané nežiadúce účinky v podobe neplánovaných pohybov zubov. O týchto nežiadúcich účinkoch ma poučili a uvedomujem si, že pri podozrení na odlepenie retenčného drôtu alebo pri nedosadnutí retenčnej fólie sa mám okamžite hlásiť v ambulancii na kontrolu.




Na obrázkoch sú príklady nežiadúcich účinkov fixného retainera.

V Bratislave dňa Podpis

Poučenie pri ukončení sledovania v ambulancii

Potvrdzujem, že som bol/a poučená/ý o potrebe používania retenčných fólií na kontrolu a udržanie výsledku ortodontickej liečby. Fólie si každý týždeň vyskúšam, a pokiaľ pocítim tlak, ponechám si v ústach nasadené celú noc. Frekvencia nosenia závisí od náchylnosti zubov k posunom. Uvedomujem si, že nosenie retenčných fólií je jediný spôsob, ako si výsledok ortodontickej liečby kontrolovať a dlhodobo udržiavať, pretože prirodzené zmeny ľudského organizmu v priebehu života sa týkajú aj zubov a čeľustí. V prípade dlhodobého ponechania fixných retainero (drôtikov) na zuboch je pravidelná kontrola fóliami ešte dôležitejšia, pretože fixný retainer môže mať aj po dlhom čase nečakané nežiadúce účinky v podobe neplánovaných pohybov zubov. O týchto nežiadúcich účinkoch ma poučili a uvedomujem si, že pri podozrení na odlepenie retenčného drôtu alebo pri nedosadnutí retenčnej fólie sa mám okamžite hlásiť v ambulancii na kontrolu.



Na obrázkoch sú príklady nežiadúcich účinkov fixného retainera.

V Bratislave dňa Podpis